

Floresta Ombrófila Mista

Também conhecida como mata-de-araucária ou pinheiral, seus ambientes de ocorrência coincidem com o clima quente e úmido, sem período biologicamente seco, com temperaturas médias anuais em torno de 18°C, mas com três a seis meses em que a temperatura se mantém abaixo dos 15°C (Foto 3).

Foto 3 - Paisagem com remanescente da Floresta Ombrófila Mista no vale, ao fundo pastagem e vegetação secundária (Bom Reposo, MG)




Foto: Liane B. A. Pinheiro, 2017.

Com presença exclusiva no Planalto Meridional brasileiro em terrenos acima de 500/600 metros de altitude, apresenta disjunções em pontos mais elevados das Serras do Mar e da Mantiqueira.

É caracterizada por uma rica mistura florística na qual se destacam as duas únicas coníferas brasileira, a *Araucaria angustifolia* (pinheiro-do-paraná) e o *Podocarpus lambertii* (pinheirinho). São identificadas quatro formações da Floresta Ombrófila Mista (Figura 3).

Figura 3 - Perfil esquemático da Floresta Ombrófila Mista com a representação das formações que são encontradas no País



Fonte: MANUAL técnico da vegetação brasileira: sistema fitogeográfico: inventário das formações florestais e campestres: técnicas e manejo de coleções botânicas: procedimentos para mapeamentos. 2. ed. rev. e ampl. Rio de Janeiro: IBGE, 2012. p. 83. (Manuais técnicos em geociência, n. 1). Disponível em: <https://www.ibge.gov.br/geociencias-novoportal/informacoes-ambientais/geologia/15826-manual-tecnico-em-geociencias.html?edicao=15934&t=publicacoes>. Acesso em: jan. 2019.